



Pasientinformasjon ved positiv klamydia prøve

Dersom din klamydia prøve er positiv, vennligst les denne informasjonen!

Infeksjon med Chlamydia trachomatis (klamydia)

Bakterien kan overføres via samleie og andre seksuelle aktiviteter. Den finnes i urinrøret og hos kvinner også i skjeden. Symptomer kan være svie ved vannlating, økt utflod, magesmerter og feber, men mange har ingen symptomer på infeksjon. Menn kan i noen tilfeller få betennelse i bitestikler (epididymitt) eller prostata (prostatitt). Kvinner kan oppleve småblødning under/etter samleie eller mellom menstruasjoner. Symptomene kan ikke skilles fra symptomer ved en genital mykoplasmainfeksjon.

Ubehandlet kan infeksjonen medføre at kvinner kan få skade på eggledere med risiko for svangerskap utenfor livmoren og sterilitet. Overføring kan skje fra mor til barn ved fødsel. Bakterien kan føre til komplikasjoner i form av leddbetennelse og kan også forårsake øyeinfeksjon både hos nyfødte og voksne.

Behandling/oppfølging

Et nytt funn av Chlamydia trachomatis bør alltid behandles. Ta derfor kontakt med din lege for behandling og videre oppfølging. Prøvesvaret ditt bør medbringes til konsultasjon. Behandling av klamydia er gratis for pasienten. Infeksjonen behandles med antibiotika.

Det er VIKTIG at du følger instruksjoner legen gir deg!

Kontrollprøve anbefales tatt 6-8 uker etter avsluttet behandling.

Partnervarsling

Partneroppsporing og partnervarsling er svært viktig for å hindre spredning av bakterien. Din(e) seksualpartner(e) bør informeres og undersøkes.

Medisinsk ansvarlig lege

Unilabs Laboratoriemedisin AS

Avdeling for medisinsk mikrobiologi